

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### **BREXIDOL 14 mg, cerotto medicato** Piroxicam

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è BREXIDOL e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere BREXIDOL
3. Come prendere BREXIDOL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare BREXIDOL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è BREXIDOL e a cosa serve**

BREXIDOL contiene il principio attivo piroxicam che appartiene alla classe dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) che agiscono contro il dolore, la febbre e l'infiammazione.

BREXIDOL cerotto si applica sulla cute ed è utilizzato per ridurre il dolore e l'infiammazione di articolazioni, muscoli, tendini e legamenti, dovuti a traumi o malattie reumatiche.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare BREXIDOL**

##### **Non usi BREXIDOL se:**

- è allergico (ipersensibile) al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- ha avuto allergia dopo l'assunzione di altri farmaci contro il dolore e l'infiammazione (FANS);
- ha l'asma;
- ha un'ulcera allo stomaco e/o al duodeno (peptica);
- ha avuto episodi di sanguinamento allo stomaco o all'intestino (inclusi sangue nel vomito o durante l'evacuazione o feci nere e catramose) dopo l'assunzione di altri farmaci contro il dolore e l'infiammazione (FANS);
- sta usando farmaci che fluidificano il sangue (anticoagulanti);
- è in gravidanza o sta allattando con latte materno;

BREXIDOL non deve essere usato nei bambini con meno di 12 anni di età.

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico prima di usare BREXIDOL se:

- ha problemi al cuore;
- ha gravi problemi al rene;





